

CoMiSS® :

Score des symptômes liés à l'allergie aux protéines de lait de vache

Nom : Prénom : Age : Date :

OBJECTIF

Le CoMiss est un outil simple, rapide et facile à utiliser pour aider au diagnostic de l'Allergie aux Protéines de Lait de Vache (APLV). Il doit permettre d'améliorer la reconnaissance des symptômes les plus fréquents de l'APLV pour que le diagnostic soit plus précoce. Le CoMiss peut aussi être utilisé pour évaluer et quantifier l'évolution des symptômes durant la prise en charge de l'APLV.

MISE EN ŒUVRE

En présence de symptômes potentiellement liés à l'ingestion de lait de vache, cotez les symptômes observés ou rapportés par la famille en choisissant le score le plus approprié pour chaque type de symptôme. Additionnez ensuite les scores de chaque symptôme et notez le score total en bas du formulaire.

SYMPTOMES	SCORE				
Pleurs*	0	≤ 1h / jour			SCORE <input type="text"/>
	1	1 à 1,5h / jour			
	2	1,5 à 2h / jour			
	3	2 à 3h / jour			
	4	3 à 4h / jour			
	5	4 à 5h / jour			
	6	≥ 5h / jour			
Régurgitations	0	0 à 2 épisodes / jour			SCORE <input type="text"/>
	1	≥ 3 à ≤ 5 épisodes / jour de faibles volumes			
	2	> 5 épisodes / jour et d'un volume > 1 cuillère à café			
	3	> 5 épisodes / jour d'environ la moitié de la quantité de nourriture ingérée dans au moins la moitié des repas			
	4	Régurgitation continue de petits volumes ≥ 30 min après chaque repas			
	5	Régurgitation de plus de la moitié à la totalité de la nourriture ingérée dans au moins la moitié des repas			
	6	Régurgitation complète de la nourriture à la fin de chaque repas			
Selles (échelle de Bristol)	4	Type 1 et 2 (selles dures)			SCORE <input type="text"/>
	0	Type 3 et 4 (selles normales)			
	2	Type 5 (selles molles)			
	4	Type 6 (selles liquides sans relation avec une infection)			
	6	Type 7 (selles aqueuses)			
Symptômes cutanés	0 à 6	Eczéma atopique	TÊTE - COU - TRONC	BRAS - MAINS - JAMBES - PIEDS	SCORE <input type="text"/>
		Absent	0	0	
		Léger	1	1	
		Modéré	2	2	
		Sévère	3	3	
	0 ou 6	Urticaire	NON 0	OUI 6	<input type="text"/>
	Symptômes respiratoires	0	Absence de symptôme respiratoire		
1		Symptômes légers			
2		Symptômes modérés			
3		Symptômes sévères			

* Doit être pris en compte seulement si l'enfant pleure pendant 1 semaine ou plus, évalué par les parents et s'il n'y a pas d'autre cause évidente.

SCORE TOTAL

LIRE LES RÉSULTATS

Le score du CoMiSS est compris entre 0 et 33. Chaque symptôme a un score maximal de 6, à l'exception des symptômes respiratoires où le score maximal est de 3.

Total ≥ 12 : les symptômes sont probablement liés au lait de vache. Cela peut être une APLV.

Total < 12 : les symptômes ne sont peut-être pas liés au lait de vache. Rechercher d'autres causes.

Le diagnostic de l'APLV ne peut être confirmé que par un régime d'éviction suivi d'une épreuve de réintroduction.

Vandenplas, Y., Dupont, C., Eigenmann, P., Host, A., Kuitunen, M., Ribes-Koninck, C., Shah, N., Shamir, R., Staiano, A., Szajewska, H. and Von Berg, A. (2015). A workshop report on the development of the Cow's Milk-related Symptom Score awareness tool for young children. Acta Paediatrica. doi: 10.1111/apa.12902